

# SANATHERM<sup>®</sup>

## PNO silikon

» Výrobní číslo 0705

### **pigmentovaný penetrační nátěr pod SANATHERM O silikonovou omítkovinu**

#### Vlastnosti:

**SANATHERM PNO silikon** je pigmentovaná vodou ředitelná penetrační nátěrová hmota vyrobená na bázi vodné disperze vodné disperze silikonů a dalších polymerů, anorganických pigmentů, plniv a aditiv. Nátěr sjednocuje savost podkladů a jejich odstín a zvyšuje přilnavost omítkoviny. Má vysokou paropropustnost.

#### Oblast použití:

**SANATHERM PNO silikon** je určen k nátěrům venkovních i vnitřních povrchů stěn a armovací vrstvy zateplovacích systémů **SANATHERM** a **SANATHERM minerál** před aplikací omítkoviny **SANATHERM O silikonová omítkovina**.

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l
	0 kg/kg

#### Spotřeba:

0,15–0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### Odstín:

bílý, možnost tónování

#### Balení:

5 a 20 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. Nesmí zmrznout!

#### Zpracování:

**SANATHERM PNO silikon** se neředí. Po řádném promíchání se nanáší štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5°C až 25°C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu je možné nanášet až po zaschnutí penetračního nátěru (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci :

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **SANATHERM PNO silikon** zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.